EB Monte Belo

Setúbal

Nome vulgar: Loureiro

Nome Científico: Laurus nobilis

Tipo de origem: Região mediterrânica.

Distribuição Geográfica desta espécie: Em Portugal, no centro e norte junto ao mar.

Curiosidades: O loureiro é uma árvore de folhas persistentes e chega a atingir os 10 metros, necessita de rega nos meses de verão. Resiste moderadamente ao frio. A época de Floração é entre fevereiro e abril. A árvore é utilizada para fazer móveis de luxo, persianas e pequenas embarcações. Desde a antiguidade que é utilizado para distinguir o mérito dos poetas e dos atletas. Era costume oferecer uma coroa de folhas de louro a vencedores.

EB Monte Belo

Setúbal

Nome vulgar: Marmeleiro

Nome Científico: Cydonia oblonga

Tipo de origem: Oriunda da Á sia Ocidental.

Distribuição Geográfica desta espécie: Em Portugal, na zona do Alentejo.

Curiosidades: O marmeleiro é uma pequena árvore cujos frutos são chamados marmelos. Também é conhecido pelos nomes de marmelo-da-europa, marmelo e pereira-do-japão.
É uma planta de porte médio , tem um tronco tortuoso e a copa arredondada. Mede entre 2 e 6 metros de altura. Adapta-se a diferentes tipos de solo mas prefere solos férteis.
Flores e Frutos: As flores são de cor rosa ou tom amarelado e o fruto, o marmelo, mede cerca de 10 a 12 centímetros.
Folhagem: As folhas são oblongas e caducas.

EB Monte Belo

Setúbal

Nome vulgar: Nespereira

Nome Científico: Eriobotrya japonica

Tipo de origem: Sudeste da China

Distribuição Geográfica desta espécie: No norte de Portugal,.

Curiosidades: A nespereira é uma árvore pequena, com um tronco curto. Pode crescer até 10 m de altura, mas é geralmente menor.
Prospera melhor nas zonas quentes e resguardadas, mas sem calores fortes.
As flores são grandes e brancas de intenso aroma. Os frutos são ovais de casca aveludada e macia de cor amarelo alaranjado.
As folhas são alternadas, simples, de 10 a 25 cm, verde escuras, de textura rígida e com a borda serrilhada. A copa é arredondada e o tronco curto.

EB Monte Belo

Setúbal

Nome vulgar: Medronheiro

Nome Científico: *Arbutus unedo*

Tipo de origem: É uma planta nativa da região mediterrânica e Europa Ocidental.

Distribuição Geográfica desta espécie: Pode ser encontrada tão a norte como no oeste da França e Irlanda. Sobrevive em zonas de elevado declive onde dificilmente outras culturas sobrevivem. Em Portugal, pode ser encontrado por todo o país, mas a maior concentração ocorre nas serras do Caldeirão e Monchique.

Curiosidades: O medronheiro tem normalmente um crescimento do tipo arbustivo até uma altura de aproximadamente 5 metros com ramos eretos. A copa é arredondada com folhas persistentes de formato elíptico de cor verde-escura com brilho ceroso na face superior. As flores são de cor branca ou levemente rosadas. É considerada uma planta ornamental. Os frutos são esféricos, carnudos e comestível, bastante apreciados sobretudo no sul de Portugal, onde são usados na produção de licores e aguardentes.

EB Monte Belo

Setúbal

Nome vulgar: Tangerineira

Nome Científico: *Citrus mitis*

Tipo de origem: Ásia e Austrália

Distribuição Geográfica desta espécie: Um pouco por todo o mundo. Em Portugal, o cultivo deste fruto é mais representativo na zona do Algarve e Ribatejo.

Curiosidades: A tangerineira é uma árvore pequena, espinhosa e de folha perene, adaptando-se perfeitamente às condições climáticas desérticas, semitropicais e subtropicais, mas o fruto é mais sensível a sofrer lesões provocadas pelo frio do que a maioria das laranjas e das toranjas, devido à pequena espessura da epiderme.

EB Monte Belo

Setúbal

Nome vulgar: Abacateiro

Nome Científico: Persea Americana

Tipo de origem: América do Sul

Distribuição Geográfica desta espécie: Em Portugal existe uma área de produção cultivada de aproximadamente 320 hectares. O Algarve é a zona de maior produção reunindo uma área de cerca de 230 hectares.

Curiosidades: É uma árvore de grande porte (chega a ultrapassar os 30 metros de altura), tem maior adaptação nos solos húmidos. Existem mais de 500 variedades de Abacateiros . O fruto varia entre as 150 e 500 gramas . A produção de uma árvore adulta varia entre 200 e 800 frutos por ano. As suas flores são hermafroditas. As variedades de abacate apresentam comportamentos distintos relativamente ao período do dia no qual ocorre a abertura das flores. Umas abrem as masculinas pela manhã e as femininas pela tarde ou vice versa. Desta forma, no pomar de abacateiros é necessário ter 2 tipos de planta para garantir a fecundação das flores.