



**Instituto Vaz Serra**

**Sertã**

**Nome vulgar:** Nespereira (Existem 2 espécimes)

**Nome Científico:** *eriobotrya japonica lindl*

**Data em que foi plantada (aproximada):** + de 40 anos

**Tipo de Origem:** Alóctone ou exótica

**Distribuição Geográfica desta espécie:** Sudeste da China; naturalizada no Japão.

Tipo de reprodução: hermafrodita

Início de floração: outubro

Folha perene; O fruto é carnudo.

A nespereira é uma árvore de fruto, dissemina-se através das sementes, por enxertia ou estacaria. De crescimento rápido, é uma árvore pouco exigente quanto a requisitos de terreno e clima. Desenvolve-se bem em lugares luminosos, tolera as geadas e períodos prolongados de secura.

O nome genérico deriva das palavras gregas erion (lã) e botrys (cacho de uvas), alusivo à disposição das flores e frutos em panículas e a presença de pelos.



Fo



**Instituto Vaz Serra**

**Sertã**

**Nome vulgar:** liquidâmbar, árvore-do-estoraque (Existem 5 espécimes)

**Nome Científico:** *liquidâmbar styraciflua L.*

**Data em que foi plantada (aproximada):** de 3 a 7 anos

**Tipo de Origem:** Alóctone ou exótica

**Distribuição Geográfica desta espécie:** América do Norte e Central (Sul dos E.U.A, México e Guatemala)

Tipo de reprodução: monóica

Floração: fevereiro a maio

O liquidâmbar é uma árvore que pode alcançar, no seu local de origem, 40 m de altura, de tronco direito, casca acinzentada, grossa e fendida nos exemplares mais velhos



## Instituto Vaz Serra

**Nome vulgar:** cedro-do-atlas-de-folhas-azuis, cedro-do-atlas, cedro (Existem 2 espécimes)

**Nome Científico:** *cedrus atlântica (Endl) carrière*

**Data em que foi plantada (aproximada):** + 20 anos


**Tipo de Origem:** Alóctone ou exótica

**Distribuição Geográfica desta espécie:** África do Norte

Tipo de reprodução: monóica

Floração: setembro a novembro

Propaga-se por semente em viveiro. A madeira do *Cedrus atlântica* é de boa qualidade. Tem forte odor aromático, sendo fácil de manusear. Resiste muito bem à putrefação, podendo aguentar inalterada muitos anos. É utilizada sobretudo em construções de postes, vigas, mas também em carpintaria de luxo.





## Instituto Vaz Serra

**Nome vulgar:** pinheiro-do-Oregon, abeto-de-Douglas, abeto-de-Oregon (Existem 3 espécimes)

**Nome Científico:** *Pseudotsuga menziesii* Lindl.

**Data em que foi plantada (aproximada):** + 20 anos

**Tipo de Origem:** Alóctone ou exótica

**Distribuição Geográfica desta espécie:** América do Norte Ocidental (desde o Canadá até ao México)

Tipo de reprodução: monóica

Floração: abril a junho

Habitat ocorre nas florestas de coníferas da costa Oeste da América do Norte, normalmente em solos húmidos, siliciosos, preferencialmente em serras e montanhas (0-3000 m).

É uma árvore de crescimento rápido, muito adequada para repovoamentos em climas húmidos, pois tem um rendimento em madeira superior a todas as outras coníferas europeias.

## Sertã

