

Alecrim - Rosmarinus officinalis

É uma erva aromática comum na região do Mediterrâneo ocorrendo dos 0 a 1500 metros de altitude, preferencialmente em solos de origem calcária. Devido ao seu aroma característico, os romanos designavam-no como *rosmarinus*, que em latim significa orvalho do mar.



Alfazema – Lavandula dentata

Também conhecida como Rosmaninho é uma espécie de planta da família Lamiaceae, nativa do Mediterrâneo, das ilhas do Atlântico e da península Arábica. Com 60 cm de altura, apresenta folhas verde-acinzentadas, lineares ou em forma de lança,



Árvore da borracha - *Ficus elastica*

Conhecida pelo nome comum de árvore-da-borracha, planta da borracha ou falsa-seringueira, é uma *Moraceae* tropical, originária de uma vasta região que se estende desde o subcontinente indiano até à Malásia e à Indonésia.



Download from
Dreamstime.com
This watermarked comp image is for previewing purposes only.

ID 116425107
© Bigapplestock | Dreamstime.com

Casuarina - *Casuarina equisetifolia*

Pertence a um género que agrupa 17 espécies de árvores e arbustos da família *Casuarinaceae*, caracterizados por ostentarem ramos esbeltos e delicados, com folhas reduzidas a escamas, o que lhes confere um aspeto semelhante a pinheiros esbeltos.



Cedro-do-mato - *Juniperus brevifolia*

Conhecido pelo nome comum de cedro-do-mato, cedro-das-ilhas ou zimbro, é uma espécie de árvore de médio porte endémica nos Açores.



Choupo branco - *Populus alba*

Também conhecido por álamo, pópulo *ou* choupo pertence à família *Salicaceae*. O choupo-branco é uma árvore de folha caduca, de crescimento rápido, que pode alcançar 25 m de altura. Possui um tronco branco com fissuras castanhas em forma de losango as quais, com a idade das árvores tendem a aumentar.

As folhas, de 5 lóbulos desiguais, são verdes na página superior e brancas na página inferior, com pecíolo longo.



Choupo negro - Populus nigra

Também conhecida popularmente como álamo, álamo-negro, entre outros, é uma espécie de choupo pertencente a família das *salicaceae*.



Cinamomo - *Melia azedarach*

Também conhecida por Árvore-santa, Bombal, Bombolo-de-portugal, Cedro-do-ceilão, Conteira, Jasmim-azul.

O cinamomo é uma árvore interessante quando desejamos um efeito rápido na paisagem, devido ao seu desenvolvimento veloz, que pode chegar a 3,5 metros por ano.



Erva das pampas - Cortaderia seluana

Erva-das-pampas listada como espécie invasora em Portugal



Ficus - Ficus benjamina

Chamadas popularmente de fícus-benjamim, figueira-benjamim ou, simplesmente, figueira. São originárias da Malásia. É uma espécie de planta da família *Moraceae* pertencente ao género *Ficus*.

O ficus é uma árvore muito popular, utilizada principalmente na decoração de ambientes interiores. Com caule acinzentado, raízes aéreas e ramos pêndulos, ela tem crescimento moderado a rápido



Lodão bastardo – *Celtis australis*

É uma árvore que pode atingir os 25 m de altura, dependendo das condições ambientais, com um tronco robusto e reto, de casca quase lisa. O seu crescimento é lento: em dez anos pode crescer 1,5 m em altura. Em termos de longevidade pode chegar aos 600 anos de idade.



Lúcia lima - *Aloysia triphylla*

É impossível ficar indiferente à fragância que emana das folhas da Lúcia-lima, também é conhecida como Limonete e Bela-luísia entre outros nomes comuns.

O aroma a limão é refrescante, puro e intenso. Leva-nos a desejar ter pelo menos um arbusto na nossa horta



Nespereira - *Eriobotrya japonica*



Oleandro - *Nerium oleander*

O oleandro é um arbusto perene nativo da Ásia e do tipo ornamental de ocorrência natural espontânea também nas regiões mediterrânicas.



Pimenteira Bastarda - Schinus molle

Schinus molle, conhecida pelos nomes populares de aroeira-salso, aroeira-mole, aroeira-periquita, aroeira-mansa, ou pimenteira-bastarda é uma planta perene que cresce até aos 15 metros. É nativa do sul do Brasil, do Uruguai, e do nordeste da Argentina.

É uma espécie bastante cultivada de forma ornamental, tendo sido introduzida em vários países, porém possui alto potencial invasivo



Pinheiro-bravo - *Pinus pinaster*



Pinheiro-manso - *Pinus pinea*



Piracanta - *Pyracantha angustifolia*

É uma espécie de arbusto da família das rosas. As flores são brancas e produzem pequenas pomos redondos que podem ser de cor laranja a vermelho. Essas frutas são adstringentes e amargas, tornando-as intragáveis para o homem, mas são uma fonte de alimento para pássaros. Os caules e ramos têm espinhos afiados. Este arbusto é cultivado em quintais e jardins como planta ornamental.



Plátanos – *Platanus acerifolia*

Os plátanos são árvores do género *Platanus*, da família *Platanaceae*, as quais são nativas da Eurásia e da América do Norte. São típicas dos climas subtropical e temperado. No geral, são árvores de interesse ornamental, podendo atingir entre 40 e 50 metros de altura.



Salgueiro branco - Salix alba

É um salgueiro nativo de zonas temperadas, como o centro e o sul da Europa.



Tipuana - Tipuana tipu

Também conhecida como Tipuana ou Amendoim-Acácia é uma árvore florífera e caducifólia que possui uma copa bastante densa e ampla. As folhas são opostas, compostas, com folíolos oblongos e verdes. Pode atingir uma altura de até 15 metros. Os frutos são na forma de vagem, alados e indeiscentes o que facilita a sua dispersão pelo vento.



Zambujeiro – *Olea maderensis*

O zambujeiro ou oliveira-brava é uma subespécie da bem conhecida oliveira (*Olea europaea L.*), e embora se encontre muitas vezes como arbusto ou pequena árvore, pode atingir até 15 metros de altura e ter troncos de grandes dimensões. A oliveira-brava, popularmente também conhecida como oliveira-da-rocha ou zambujeiro, é uma planta do género *Olea*, da família *Oleaceae*, espécie endémica da ilha da Madeira.

